

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*



Schwarzhalstaucher *Colymbus auritus* Geörhter Lappentaucher
Kupferstich von Johann Friedrich NAUMANN, aus: J. F. NAUMANN,
Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, 9. Theil, Leipzig 1838

Frühere Artnamen:

Schwarzhalssteissfuss *Podiceps nigricollis* (Brehm) (Löns, H., 1907)

Schwarzhalstaucher *Podiceps n. nigricollis* Brehm. (Brinkmann, M., 1933)

Schwarzhalstaucher *Podiceps n. nigricollis* Brehm. (Tantow, F., 1936)

Löns, H., 1907:

Möglichen Falles ab und zu Gast.

Brinkmann, M., 1933:

Vereinzelter oder seltener Brutvogel.

Vom Brüten des in Holland, Schleswig-Holstein und in der Mark brütenden Schwarzhalstauchers war bis in neuere Zeit hinein nichts Sicheres zu erkunden. ...

Reichling (1932) fand ihn seit 1921 als Brutvogel auf dem Dümmer und sah Alt- und Jungvögel auf dem Geester Teiche. R. Blasius (1887) hatte den Schwarzhalstaucher als sehr seltenen Durchzugsvogel bezeichnet.

Tantow, F., 1936:

Der Schwarzhalstaucher, *Podiceps n. nigricollis* Brehm. Diesen Taucher sah ich am 23. Mai 1934 auf der „Havekost“. Ob er dort brütet, ist mir nicht bekannt. Döhling (1930) stellte 1929 das Brüten auf dem Aufspülgelände bei Billwerder-Moorfleth fest.