


Raubwürger *Lanius excubitor*



Raubwürger *Lanius excubitor* Der große graue Würger
Kupferstich von J. C. SUSEMIHL, aus: BORCKHAUSEN (Hg.), *Teutsche Ornithologie oder Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands*, Darmstadt 1800-1811

Frühere Artnamen :

Großer Würger, Berg-Elster. *Lanius excubitor*, L. (Kohlrausch, Dr. F. und H. Steinvorth, 1861)

Grosser Würger *Lanius excubitor* L. (Krohn, H., 1904)

Raubwürger *Lanius excubitor* L. (Löns, H., 1907)

Oestlicher Raubwürger *Lanius excubitor major* Vieill. (Löns, H., 1907)

Großer Raubwürger *Lanius e. excubitor* L. (Brinkmann, M., 1933)

Großer Raubwürger *Lanius e. excubitor* L. (Tantow, F., 1936)

Raubwürger (Kiefer, H., 1953)

Regionale Artnamen:

Radekker (Münsterland), **Radbreker** (Lippe), **Schreikiakster** (Iburg), **Old Radbraker**, **Dickkopp**, **Brägenbiter** (Weserland). (Brinkmann, M., 1933)

Kohlrausch, Dr. F. und H. Steinvorth, 1861:
Brutvogel. Im Winter öfter in der Nähe der Stadt.

Krohn, H., 1904:
Nach Steinvorth und Kohlrausch – 1861 – im Winter öfter in der Nähe der Stadt Lüneburg.

Löns, H., 1907:
Raubwürger. *L. excubitor* L. Verbreiteter Brutvogel.
Oestlicher Raubwürger. *L. excubitor major* Vieill. Er wird ständiger Wintergast sein.
Präparator Wiegand schenkte dem Prov.-Museum ein im November 1905 bei Beinhorn bei Burgdorf geschossenes Stück; ich schoss ihn im Spätherbste 1906 bei Westenholz. Präparator Kreye erhielt ihn im Winter 1905 aus der Heide.

Drenckhan, H., 1926:
Es wäre nun ja noch mancher Vögel zu gedenken, die wir auf Spaziergängen bei und um Lüneburg sehen und hören, so Spechte: Schwarzspecht in der Schleuse, Grünspecht häufiger in den Gärten; den kleinen Buntspecht sah ich nur einmal im Kurpark, Eichelhäher besonders im Herbst überall, Würger, den großen traf ich hinter Böhmsholz, den Pirol hört man häufig in Wilschenbrook usw.

Brinkmann, M., 1933:
Regelmäßiger Brutvogel.
Die Artzugehörigkeit der Raubwürger scheint nicht genügend geklärt. Der einspiegelige nordöstliche Raubwürger (*Lanius major* Pall) wird von Hartert nicht als besondere Form angegeben. Weigold warnt vor der Trennung, da Ein- und Zweispiegler zugleich unter norwegischen Jungvögeln im gleichen Nest gefunden wurden. Heinroth erhielt ein einspiegeliges Junges aus der Umgebung von Hamburg. Wir begnügen uns daher mit der Anführung der auf *Lanius major* lautenden Berichte ohne Sonderung.
Unseren *excubitor* trifft man im ganzen Gebiet an, im Westen weniger verbreitet als im Osten.

Tantow, F., 1936:
Ob der Große Raubwürger, *Lanius e. excubitor* L., Brutvogel ist, konnte ich nicht herausbekommen, obgleich ich ihn in der Lüneburger Elbniederung im Sommer, freilich nie vor Juli, verschiedentlich hier und da sah. Außerhalb der Brutzeit kann man ihn häufiger feststellen.

Kiefer, H., 1953:
Mäusebussard, Raubwürger und Turmfalke zeigen sich regelmäßig über der Marsch.