

Graugans *Anser anser*

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2008-2016)

Status: rB >1.000 BP rG 1.001-5.000 Ind.	Datensätze: n.b. Datenlage: n.b.	Status Nds: I Bestand Nds: 4.500 P RL Nds: *	Status D: I ^B I ^W Bestand D: mh ^B 26.500-37.000 P h ^W RL D: * ^B * ^W
--	-------------------------------------	--	---

Im Rahmen der landesweiten Gänseerfassung 2016 wurden im Landkreis Lüneburg gemäß der Auswertung von H. RAHLFS 1.559 Revierpaare gezählt.

Die am 30.12.2012 von J. WÜBBENHORST beobachtete Graugans (Foto 8) mit dem gelben Halsband H28 wurde am 21.06.2008 auf Rügen in Mecklenburg-Vorpommern beringt und in den Bundesländern Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sowie in Polen (Pommern) beobachtet.



Foto 1: 30.12.2012, farbberingte Graugans, Bleckede, Vierwerder, Jann Wübbenhorst

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2001-2007)

Graugans *Anser anser*

rB 21-50 rG 1.001-5.000	Datensätze 2.398 / 343 Datenlage mittel	RL: Nds * ; D *
----------------------------	--	-----------------




Abb. 21: Graugans: Links: Jahresmaxima während der regelmäßigen Wasservogelzähltermine 1996/97 bis 2006/07; Trend hochsignifikant ($p < 0,05$), Zunahme. Rechts: durchschnittliche Monatssummen (Anzahl Ind.) während der regelmäßigen Wasservogelzähltermine 1996 bis 2007.

Anhand der Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung und spezieller Gänsezählungen wurde für den Zeitraum 2001-2004 ein Herbstrastbestand in Deutschland von 120.000-130.000 Graugänsen ermittelt, davon etwa die Hälfte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Rastbestände im Januar liegen dagegen deutlich niedriger, da ein erheblicher Teil der Population diese Jahreszeit in Winterquartieren in Spanien, Frankreich und den Niederlanden verbringt (HEINICKE 2006).

Rastbestände im Berichtsgebiet überwiegend an der Elbe und im westlichen Amt Neuhaus, nur wenige Beobachtungen (im Vergleich zu den anderen beiden häufigen Gänsearten) in der Echemer und Scharnebecker Marsch. Regelmäßig auch Meldungen von bis zu 12 rastenden Graugänsen aus dem Raum Amelinghausen.

Die Art brütet überwiegend entlang der Elbe.

Hybride Graugans x Kanadagans:

11.01.2002	2 Ind.	Sassendorf/Hohnstorf (G. BARDOWICKS)
15.03.2002	2 Ind.	Sassendorf/Hohnstorf (G. BARDOWICKS)
28.02.2005	2 Ind.	Barförde-Sassendorf (G. BARDOWICKS)

Hybride Graugans x Höckergans:

03.03.2003	1 Ind.	Grünendeich-Barförde (G. BARDOWICKS)
------------	--------	--------------------------------------

Hybride Graugans x Saatgans:

20.03.2006	1 Ind.	Elbvorland Brackede - Vierwerder (G. BARDOWICKS)
------------	--------	--

Phänologie:

Durchzug nach Westen und Rast 1969 bis 1982 in der Lüneburger Elbmarsch zwischen zweiter Oktober- und erster Januarwoche (ALLMER 1984). In Hamburg Ende der 1980er Jahre bereits ab Ende September/Anfang Oktober (KONDZIELLA 2008). 1996 bis 2007 wurden ziehende und rastende Graugänse im Berichtsgebiet bereits ab September beobachtet (Abb. 21).

Habitat:

In den Wintermonaten Oktober bis März 2001/02 bis 2006/07 wurden die Graugänse häufiger als andere Gänse auf Gewässern beobachtet (10 bis 55 %). Grünland wurde im Berichtszeitraum mit 27 bis 63 % am häufigsten und mit steigender Tendenz genutzt (Tab. 16).

Tab. 16: Die gemeldeten Habitats in den einzelnen Wintern (jeweils Oktober bis März) 2001/02 bis 2006/07

Habitats	Winter					
	2001/02 (%)	2002/03 (%)	2003/04 (%)	2004/05 (%)	2005/06 (%)	2006/07 (%)
Grünland	27	46	47	48	63	63
Grüneinsaat	0	0	0	0	5	10
Acker	0	3	0	3	5	4
Ölsaats	5	16	5	5	9	6
Getreide	5	3	12	6	11	3
Wintergetreide	0	0	0	0	0	0
Mais	9	3	0	3	2	2
Stoppelacker	0	0	0	0	0	0
Überschwemmte Wiesen	0	0	14	6	0	2
Ackerbrache	0	0	0	0	1	0
Gewässers	55	30	21	28	16	10
Summe Beobachtungen (n)	22	37	57	64	85	105

Schlafplätze:

15.12.2001	10 Ind.	Elbe/Vorland bei Darchau (WASSERVOGELZÄHLUNG ALLMER)
06.10.2004	300 Ind.	NSG Fehlingsbleck (K.-W. KIRSCH, U. RICK)
16.01.2005	50 Ind.	Bleckede, Nordteil Weidewerder (F. ALLMER)
13.06.2006	42 Ind.	NSG Habekost (F. ALLMER)
11.09.2006	1.100 Ind.	am Sumtekanal N Stiepelse (K.-W. KIRSCH, U. RICK)
10.12.2006	unbest. Anzahl	Wehninger Haken (F. ALLMER)
05.02.2007	30 Ind.	Elbe bei Bleckede (K.-W. KIRSCH, U. RICK)
21.10.2007	16 Ind.	NSG Fehlingsbleck (F. ALLMER)

Brutvorkommen:

Die Art brütete überwiegend entlang der Elbe. Folgende Meldungen weisen auf eine Ausbreitung in den restlichen Landkreis hin:

2003	1 BP, erfolgreich	Raum Bockum-Wulfstode (P. LEX)
2006	1 BN	Ellringen Neetzetal (T. CHRISTOPHERSEN)
2006	1 BP mit 3 juv.	Vierhöfen, Kiesgrube, Ortsrand (F. ALLMER)
2007	1 BP	Teich an der Straße Thomasburg-Neetze (F. ALLMER)
2007	2 BP	Teich N der Mühle Neumühlen (F. ALLMER)
2007	2 BP	Lüdersburg, Teich NW Im Eschen (F. ALLMER)
2007	1 BP	Süttorfer Moor, Sumpfwiese (F. ALLMER)

Tab. 17: Anzahl der gemeldeten und veröffentlichten Graugans-Brutpaare im Landkreis Lüneburg in den Jahren 2001 bis 2007.

Jahr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Brutpaare	34	18	4	16	9	29	48

Jungvögel:

Tab. 18: Termine der ersten Graugansgössel im Landkreis Lüneburg in den Jahren 2001 bis 2007.

Jahr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
------	------	------	------	------	------	------	------

Datum	05.05.	07.04.	24.04.	19.04.	29.04.	12.05.	13.04.
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Jagdstrecke, Fallwild und Verkehrstopfer:

Tab. 19: Jagdstrecke der Graugans im Landkreis Lüneburg in den Jagdjahren 2001/02 bis 2006/07.

Jahr	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
Anzahl	364	448	372	372	291	443

Tab. 20: Fallwild und Verkehrstopfer der Graugans im Landkreis Lüneburg in den Jagdjahren 2001/02 bis 2006/07.

Jahr	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
Anzahl	0	0	1	0	0	6

Ringmeldungen:

1987 wurde in Hamburg/Öjendorf mit der individuellen Beringung von Graugänsen während der Brutzeit begonnen. Bis zum 31.12.2004 lagen 46 Ringablesungen und Wiederfunde aus dem Berichtsgebiet vor (HOFF 2005).

MK