

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2008-2016)

Status: rB 8-20	Datensätze: 46 Datenlage: gut	Status Nds: I Bestand Nds: 210 R RL Nds: *	Status D: I ^B I ^W Bestand D: s ^B 5.500-9.500 R mh ^W RL D: * ^B * ^W
--------------------	----------------------------------	--	---

Ähnlich wie beim Schlagschwirl sind die Vorkommen des Rohrschwirls unstet. Alle Beobachtungen stammen aus den Monaten April bis Juli. 2008 wurden keine Sichtungen gemeldet. 2016 gab es mit 13 Sängern das stärkste gemeldete Vorkommen (Abb. 1).

Es liegen 46 Meldungen von folgenden Orten vor:

Alt Garge-Alt Wendischthun	Artlenburg	Barum
Echemer Marsch	Darchau	Gosewerder
Gutizer Renswiesen	Habekost	Ilmenau
Kolkhagen	Neu Wendischthun	Neuhaus-Gülze
Preten	Roddau	Stiepelse
Striepelsee	Sudeniederung	Wilkenstorf
Zeetze		



Foto 1: 04.05.2016, Rohrschwirl, Fehlingsbleck, Christine Horn

WÜBBENHORST et al. (2014) geben für das EU-Vogelschutzgebiet Niedersächsische Mittelelbe, das zu 71% im hier betrachteten Landkreis liegt, 19 Reviere an. Anhand der vorliegenden Daten wird von einem Brutbestand von 8 bis 20 Paaren ausgegangen.




Abb. 1: Rohrswirl. Links: Summe der Beobachtungen (46 Datensätze) und der beobachteten Individuen (55 Ind.). Rechts: durchschnittliche Monatssummen (Anzahl Ind.) im Landkreis Lüneburg 2008 bis 2016

TC

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2001-2007)

Rohrswirl *Locustella luscinioides*

urB 8-20	Datensätze 16 / 2 Datenlage mittel	RL: Nds 3 ; D *
----------	---------------------------------------	-----------------

Alle Feststellungen:

. .2001	1 sg.	Preten (F. BINDRICH)
04.05.2001	3 sg.	Neu-Bleckede-Stiepelse (M. KORSCH)
05.05.2001	1 sg.	NSG Habekost (F. ALLMER)
08.06.2001	1 sg.	Preten (M. KORSCH, H. MULSOW)
06.05.2005	1 sg.	Brackeder Stau (G. BARDOWICKS)
16.05.2006	1 sg.	Niendorf, Krainke (K.-W. KIRSCH, U. RICK)
Mai/Juni 06	1 BV	Vorland Radegast (G. BARDOWICKS)
Mai/Juni 06	1 BV	Brackeder Stau (G. BARDOWICKS)
Mai/Juni 06	1 sg.	Habekost (G. BARDOWICKS)
Mai 2006	1 sg.	Heisterbuschwiesen (J. WÜBBENHORST)
Juni 2006	1 BV	Bleckede, Alte Elbe (V. DIERSCHKE)
19.06.2006	1 sg.	Bleckede (K.-W. KIRSCH, U. RICK)
21.06.2006	1 sg.	Mahnkenwerder, Elbvorland (K.-W. KIRSCH, U. RICK)
10.07.2006	4 sg.	Bleckede, Alte Elbe (C. HORN)
10.07.2006	1 sg.	Radegaster Haken (C. HORN)
19.05.2007	2 sg.	Bleckede, Alte Elbe (C. HORN)
27.05.2007	1 sg.	Preten, Bahndamm (H. DÜLLBERG)
08.06.2007	1 sg.	Lüneburg, Wilschenbruch (O. KLOSE)
16.06.2007	1 sg.	Preten (H. DÜLLBERG, I. SALOMON)
26.07.2007	1 sg.	Stiepelse, Elbvorland (F. ALLMER)
26.07.2007	1 sg.	Stiepeler Haken (F. ALLMER)

Ähnlich wie beim Schlagschwirl sind die Vorkommen des Rohrswirls im Landkreis Lüneburg oft unstat. Die meisten Feststellungen gelangen im Elbvorland. Offenbar kommt es dort, möglicherweise abhängig vom wechselnden Wasserstand der Elbe, zu häufigen Revierverlagerungen. So bestand am Südufer der Alten Elbe im Juni 2006 ein stabiles Revier, während im Juli

an gleicher Stelle 4 singende Männchen gehört wurden. Ein im Mai 2006 am Ostufer des Radegaster Hakens singender Vogel wurde nach der zwischenzeitlichen Überflutung im Juni nicht mehr gehört, im Juli sang hier jedoch erneut ein Rohrschwirl.

TC/JW